

Факторы негативно влияющие на психическое развитие ребенка

1. Враждебность окружающей среды;
2. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки;
3. Недооценка значения закаливания,
4. Отсутствие понятных ребенком правил, регулирующих его поведение в детском коллективе.
5. Невнимание к ребенку со стороны родителей,
6. Нерациональное и скудное питание, его однообразие
7. Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками
8. Неадекватная информация, вводящая ребенка в заблуждение, в мир иллюзий. Обман.
9. Привычки негативного поведения в результате неправильного воспитания в семье;

Общим источником угроз психологической безопасности ребенка является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, т.е. вводит в заблуждение, в мир иллюзий.

Проще говоря, когда взрослые обманывают ребенка.

И это может привести к психологическому срыву. Например, убеждают, что мама скоро придет, и малыш находится в состоянии напряженного ожидания.

Внутренние источники угрозы психологической безопасности ребенка

1. Осознание ребенком своей неуспешности на фоне других детей;
2. Отсутствие автономности;
3. Индивидуально-личностные особенности ребенка;
4. Патология физического развития.

Признаки психоэмоционального напряжения (если не наблюдались ранее)

- Трудность засыпания и беспокойный сон;
- Усталость после нагрузки, которая совсем недавно ребенка не утомляла;
- Беспричинная обидчивость, плаксивость или, наоборот, повышенная агрессивность;
- Рассеянность, невнимательность;
- Беспокойство, непоседливость;
- Отсутствие уверенности в себе, которое выражается в том, что ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жметесь к ним;
- Проявление упрямства;
- Постоянно сосет палец, жует что-нибудь, слишком жадно, без разбора, ест, заглатывая при этом пищу (иногда наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита);
- Боязнь контактов, стремление к уединению, отказ участвовать в играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой комнате, не находя себе занятия);
- Игра с половыми органами;
- Подергивание плечами, качание головой, дрожание рук;
- Снижение массы тела или, напротив, проявление симптомов ожирения;
- Повышенная тревожность;
- Дневное и ночное недержание мочи, которого ранее не наблюдалось.